

{«DateLetterGenerated»}

{«Guardian»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

ګرانه {«Guardian»}:

په {«InterviewDate»}، یو {«HDName»} استازي ستاسو د ماشوم د سرب خطر سره مخ کیدلو احتمالي سرچینو/لاملونو په اړه له تاسو سره خبرې وکړي. ترل شوی راپور ستاسو په ماشوم باندې د سرب اغیزې تشریح کوي او د هغه خدمت تشریح کوي چې چمتو شوی

لاندې لست شوي ځینې کارونه دي چې تاسو یې اوس کولای شئ ترڅو د خپل ماشوم د سرب خطر سره مخ کېدل کم کړئ:

- سطحي لکه د کړکۍ درشل، د کړکۍ جالی، او فرشونه په مکرر ډول ومینځئ.
- ګند او خاوري د لوړ موثریت ذرات لرونکي هوا (High Efficiency Particulate Air (HEPA)) ویکيوم سیستم سره جaro کړئ. د HEPA ویکيوم د روغتیا محلي څانګې یا د کور جوړونې ادارې لخوا په پور شتون لري.
- د خپل ماشوم لاسونه ومینځئ، په ځانګړې توګه د خورلو او خوب کولو دمخه، او په فرش یا بهر کې د لوبې کولو وروسته.
- د خپل ماشوم کالي، پاچاما او د لوبو شیان په مکرر ډول ومینځئ.
- خپل ماشوم ته یو متوازن خواړه ورکړئ چې په زیاته اندازه کلسیم (د بیلګې په توګه شیدې، پنیر، توفو او مستې) او د وینې آیرن (د مثال په توګه، پینټ بیټر یا د مېډو شوي مېلې، شنه سبزی، ممیز، او غوښه) او ټیټ غوړ لري (د سره کړو خورو څخه ډډه وکړئ). خپل ماشوم وهڅوئ چې په میز باندې خواړه وخورې ترڅو د خوارو د ککړتیا مخه ونیسل شي.
- د خپل ماشوم د لومړۍ معاینې څخه په دوو میاشتو کې د سرب لپاره بیا معاینه وکړئ یا لکه څنګه چې ستاسو د ډاکټر لخوا لارښوونه کېږي ترڅو د وینې د سرب په کچه کې د کوم بدلون څارنه وکړئ.
- د میوو یا سبزیجاتو جوس په فلزی قوطیو کې د قوطي خلاصېدو وروسته مه ساتئ - پرځای یې د پلاستیک یا شیشې قوطي وکاروئ. د سرب بلوري شیشې څخه جوړ یا وارد شویو یا زاړه لوښو کارولو څخه ډډه وکړئ.
- خپلو ماشومانو ته اجازه مه ورکړئ چې چاپ شوي مواد لکه اخبار یا مجله سره لوبې وکړي یا یې وژوي - رنګینه سیاهي ممکن سرب ولري.
- ماشومانو ته اجازه مه ورکړئ چې په څرګندو خاورو کې لوبې وکړي، په ځانګړې توګه د کور د بنسټ/بنياد شاوخوا. د چمن یا نورو خوندي پوښونو ساحې وګورئ.

د سرب په اړه نور معلومات {«HDPHONE» ته د زنگ وهلو له لارې غوښتل کېدای شي}.

په درنښت،

{«HDRepresentativeName»}

{«HDRepresentativeTitle»}

{«HDName»}

## د وینې د سرب کچې لنډیز راپور

لیاره : {«ChildFirst» «ChildLast»}  
د زیږون نېټه: {«ChildDOB»}

چمتو شوی دی لخوا د:

{«NameofIndividualPreparingReport»}  
{«TitleofIndividualPreparingReport»}

لاسلیک:

---

**{«HDName»}**  
{«HDStreetAddress»}  
{«City, State Zip»}  
{«HDPhone»}

د راپور نېټه: {«DateofReport»}

## د سرب خطر سره مخ کېدل

سرب کولای شي د انسان په بدن کې تقریباً هر سیستم ته زیان ورسوي او په لویانو او ماشومانو دواړو ناوره اغیزې لري. سرب د شپږو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د دوی د چټکې ودې او پراختیا له امله خورا زیان رسوي. د سرب ترټولو د اندېښنې وړ اغیزه د ماشوم په وده کونکو مغزو باندې ده. د سرب خطر سره مخ کېدلو پورې اړوند ستونزې ممکن د ماشوم سره د ژوند پای پورې وي او کولای شي د دوی ځیرکي کچه، چلند، او د زده کړې وړتیا باندې اغیزه وکړي. په داسې حال کې چې د انسان په وینه کې د سرب هیڅ کچه به خطر نده موندل شوې، د سرب کچه په هر ډیسپلینر کې د 3.5 مایکروګرام څخه لوړه یا مساوي د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو (CDC) لخوا لوړه ګڼل کېږي او باید اقدام وشي چې د ماشوم د سرب کچه په هر ډیسی لیټر کې د 3.5 مایکروګرام څخه ټیټې کچې ته راټیټه شي.

د اوهايو (Ohio) ډېری ماشومان چې د لیډ یا سرب لورې کچې لري د عام کورنیو دورو لخوا د سرب خطر سره مخ دي چې د 1978 د مخه ودانیو په بهر او دننه کې د سرب لرونکي رنگ ټوټه کیدلو او پوستکي کېدلو له لارې رامینځته کېږي په کومو کې چې دوی خورا ډېر وخت تیروي. ځینې ماشومان د کورنۍ د هغو غړو لخوا کور ته راوړل شوي سرب سره هم مخ کېږي چې د سرب سره کار کوي یا یو داسې شوق لري چې دوی سرب سره مخ کوي. ککړې خاورې هم د سرب ممکنې سرچینې دي. د اوبو خصوصي اکمالات او ځینې وارد شوي د مراجعینو د کارولو محصولات لکه د لوبو شیان، د آرایش وسایل، او مصالحې موندل شوي چې سرب لري، مګر معمولاً په Ohio کې په ماشومانو کې د وینې د سرب لورې شوې کچې سره تړاو نلري.

**«HDName»** ته معلومات د Ohio Department of Health (ODH) لخوا چمتو کېږي څوک چې د اوهايو (Ohio) په اوسیدونکو کې د سرب معاینې ټولې پایلې ترلاسه کوي، پرته لدې چې د دوی عمر یا د سرب کچه په پام کې ونیسي. دا برنامه د کورنۍ غړو، طبي پاملرنې چمتو کوونکو او د ټولنې نورو غړو سره مرسته کوي ترڅو د سرب خطر سره مخ کېدل کم کړي او مخنیوی یې وکړي. دا برنامه د زیږون څخه تر 72 میاشتو یا (6 کلونو) پورې ماشومانو ته مستقیم خدمت هم چمتو کوي.

## II- د مرکې پروسه

کله چې **«HDName»** پوه شي چې د 72 میاشتو څخه کم عمر لرونکي ماشوم کې د سرب کچه په هر ډیسی لیټر کې د 3.5 مایکرو ګرامو لوړه یا مساوي ده، نو **«HDName»** د ماشوم د مور او پلار یا سرپرست سره د مرکې چمتو کولو هڅه کوي ترڅو د ماشوم په چاپېریال کې د سرب احتمالي سرچینې وپېژني.

## III- د مرکې لنډیز

**«HDName»** راپور ترلاسه کړ چې د **«ChildLast»** **«ChildFirst»** د وینې د سرب کچه **«BLLResult»**  $\mu\text{g} / \text{dL}$  وه په **«DrawDate»** باندې. یوه مرکه په **«DateofInterview»** ترسره شوې وه ترڅو ستاسو د ماشوم د سرب سره مخ کېدلو احتمالي سرچینې وپېژندل شي. مرکه د **«InterviewerName»** لخوا بشپړه شوې وه.

د مرکې په جریان کې، ستاسو د کورنۍ څخه ستاسو د ماشوم د چاپېریال او چلند په اړه یو لړۍ پوښتنې وپوښتل شوې او یو پوښتنلیک بشپړ شو (په ضمیمه کې وګورئ). په داسې حال کې چې **«HDName»** ممکن ځینې چلندونه یا توکي وړاندیز کړي وي چې ممکن د ماشوم د سرب سره مخ کېدلو احتمالي لاملونو پېژندلو کې یې مرسته کړې وي، دا ناممکن دي چې د بشپړ د سرب د خطر معاینې پرته د یو ماشوم د سرب سره مخ کېدلو حقیقي سرچینې وپېژندل شي.

د زده کړې توکي چمتو شوي دي ترڅو تاسو سره ستاسو د ماشوم په چاپېریال کې د سرب سرچینې په کمولو کې مرسته وکړي. مهرباني وکړئ **«HDName»** سره په **«HDPHONE»** اړیکه ونیسئ که تاسو د دې راپور یا چمتو شویو معلوماتو په اړه کومې پوښتنې لرئ.