

{«DateLetterGenerated»}

{«Guardian»}

{«MailAddress»}

{«MailCity», «MailState» «MailZip»}

حاضرة {«Guardian»}:

أرسل إليك هذا الخطاب لإعلامك بأن طفلك، {«ChildFirst» «ChildLast»}، خضع لاختبار مستوى الرصاص في الدم.

تاريخ الاختبار {«DrawDate»}
مستوى الرصاص في الدم: {«BLLResult»} ميكروجرام/ديسيلتر

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن نتيجة اختبار الرصاص في الدم البالغة 3.5 ميكروجرام/ديسيلتر أو أكثر تعني أن طفلك قد تعرض للرصاص.

يرجى التواصل مع {«Hdname»} على {«HDPhone»} في أقرب وقت ممكن. لدينا بعض الأسئلة التي ستساعد في تحديد مصدر تعرض طفلك للرصاص. ستساعدني هذه الأسئلة أيضًا في تقديم إرشادات حول كيفية تقليل مستوى الرصاص في الدم لدى طفلك.

يمكن العثور على الرصاص في الطلاء القديم والأوساخ. عندما يبدأ الطلاء القديم في التشقق والتقشر، فإنه يصنع غبارًا من الرصاص. يمكن أن يلتصق غبار الرصاص بالأشياء التي يضعها طفلك في فمه، مثل ألعابه. يمكن لطفلك ابتلاع غبار الرصاص أو استنشاق غبار الرصاص. لا يبدو على معظم الأطفال الذين ارتفعت لديهم مستويات الرصاص في الدم المرض ولا يتصرفون بطريقة مَرَضِيَّة.

يعاني بعض الأطفال الذين لديهم مستويات عالية من الرصاص في الدم من مشاكل في التعلم والسلوك والانتباه والسمع. هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في خفض مستوى الرصاص لدى طفلك:

- اغسل يدي طفلك كثيرًا، خاصة قبل الأكل.
- اغسل حواف النوافذ وتجاويف نوافذ البدروم والأرضيات كثيرًا.
- اطلب من الأشخاص خلع أحذيتهم قبل الدخول إلى منزلك.
- قَدِّم لطفلك أطعمة غنية بالحديد والكالسيوم. بعض الأفكار عن الخيارات الغذائية الجيدة هي الحليب والجبن وزبدة الفول السوداني والزبيب والفاصوليا والأسماك.

اتصل ببرنامج التدخل المبكر في Ohio (Ohio's Early Intervention (EI)) إذا كانت لديك مخاوف بشأن نمو طفلك. الأطفال دون سن الثالثة ممن لديهم مستوى رصاص في الدم لا يقل عن 5 ميكروجرام/ديسيلتر مؤهلون تلقائيًا للحصول على EI. يعمل EI مع العائلات التي لديها أطفال منذ الولادة حتى سن الثالثة والذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل بداية ممكنة في الحياة. للتسجيل، اتصل على {1-800-755-4769} أو قم بزيارة ohioearlyintervention.org.

المرجع {«ChildIdentifier»}